New cross

Vass3R09s321-325



SINA Collection Vassal-Montpellier

1477Mtp7

And Salar

personalités qui participent ses instances de 1'0.W.I.V.I.I. ses instances de 1'0.W.I.V.I.I. membre 2002. Il demond pas assaborde ensuite les questions I - proces-verral DY LA REUNIC 1'envoi de ca procès verbal, I envoi de ca procès verbal, I









```
CLOS 7 RANG 16 Souche 310
Désignation : New Cross
              Année :
CHARGE :
               17.8
Véraison :
Maturité: 28.987
Mill.: 0,5
            Pour.: O
GRAPPE : G - M - P - Dim .: 16
Vigueur: 45
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim.: 20 X18
disc -sph. fell -ov. -obov. -cyl. -fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
         Avec pépins - apyrène
s2 ft
s3 s4 2
        JUS : (inc.) - coloré
55
```

1	! ! Nombre ! Total	DATES							
1	d'yeux	1 3,4	! 7.4 !	<u>!</u> !	1 1	! !			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				1 1 1 1			
1 4	! 4	! 1	2 ×	1	1	!			
! 5		1	i i	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	i			

Dle 7.4.87 +M

ANNEE 1988 New eross bl 147707

EMPLACEMENT 7 16 \$ 10

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité ×		oraisc mi/f ×	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité ×
2	5	6.4	8,4	0	0						
1			+15			,					

Pourriture :

Port: mi engi Vigueur: 2 faille

NOM New Cross = Alebo EMPLACEMENT 7-16 S 10

		1	-		77
1	1.	2	1	47	4
/	U	1	7	U	1

Souche	Nbre yeux	Débou. début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraiso mi/f	nfin	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 8 2 8 4 X	6	13,3	233 *	0	0				9			

Dl. 23,3,89 +5

Mill:

Pourriture: Port: Mu' luge Vigueur: 3

New Cross 7.16 \$100.1

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUR

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entierement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché.

-Calvo 83

New Good 7.16510 A-4

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Mervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU MERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 5.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - pritiellement 9.

(I) FLEUR

8 - morphile iquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

8.85

New Cross 7.16510 = Alado

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : New cross 7,16 \$ 40 (0-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

CalnotP

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

New-cross 7.165100-4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions :44x Lache 71 - Moyenne (72) - Compacte (13) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 66. A pédoncule herbace (77)- mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81).

BAIE

Tres grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Tres petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :22 x 20). De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée (3) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discolde 95 - sphérolde 96 - ellipsolde 97 - ovolde 98 troncovorde 99 - obovorde 100 - cylindrorde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic tres apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111) A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacie 117 - spiciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court (21. A pédicelle de couleur : verte [22] - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen [31] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

Calvo 87

New- eross 7.16 \$ 10(2.4) (myenfield)

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifie (1) - peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (1).

Calvor8

N° d'ordre : 1477.07 Désignation : New cross Emplacement : 7.16510

: (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : (1) L2/L : 12 - (13) - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - (27 - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : (42) - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46 - 47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : (51) - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58- 59 : 60) - 60 - 60 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - (64) - (65) - (66) - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües